



Relevé numéro 1208 - Auteur: Pedro Cerdena
Lieu : CMME-Senlisse Les Maréchaux
Date : 05.10.2024
WGS84 Latitude : 48.69135 N Longitude : 1.96017 E

Liste des taxons (total = 109) :

| Genre | Espèce | Nom français |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
| Abortiporus | biennis | Polypore bisannuel |
| Agaricus | silvicola | Agaric anisé des bois |
| Amanita | citrina | Amanite citrine |
| Amanita | citrina var. alba | Amanite citrine blanche |
| Amanita | excelsa | Amanite élevée |
| Amanita | fulva | Amanite fauve |
| Amanita | muscaria | Amanite tue-mouche, Fausse oronge |
| Amanita | pantherina | Amanite panthère |
| Amanita | rubescens | Amanite rougissante, Golmotte |
| Amanita | vaginata | Amanite vaginée, Grisette |
| Amanita | virosa | Amanite vireuse |
| Caloboletus | calopus | Bolet à beau pied |
| Calocera | cornea | Calocère cornée |
| Calocera | viscosa | Calocère visqueuse |
| Cantharellus | cibarius | Girolle |
| Cantharellus | melanoxeros | Chanterelle noircissante |
| Cantharellus | tubaeformis | Chanterelle en tube |
| Clavulina | cinerea | Clavaire cendrée |
| Infundibulicybe | gibba | Clitocybe en entonnoir |
| Clitocybe | odora | Clitocybe odorant, anisé |
| Gymnopus | dryophilus | Collybie des chênes |
| Gymnopus | erythropus | Collybie à pied rouge |
| Gymnopus | fusipes | Collybie en fuseau |
| Rhodocollybia | maculata | Collybie maculée |
| Coprinus | micaceus | Coprin micacé |
| Cortinarius | alboviolaceus | Cortinaire blanc-violet |
| Cortinarius | anomalus | Cortinaire anormal |
| Cortinarius | bolaris | Cortinaire à squames rouges |
| Cortinarius | delibutus | Cortinaire pommadé, à lames lilas |
| Cortinarius | elatior | Cortinaire élevé, à long pied |
| Cortinarius | fulmineus | Cortinaire éclatant |
| Cortinarius | hemitrichus | Cortinaire velouté |
| Cortinarius | hinnuleus | Cortinaire à couleur de faon |
| Cortinarius | paleaceus | Cortinaire pailleté |
| Cortinarius | torvus | Cortinaire odorant, C. à chaussette |
| Cortinarius | violaceus | Cortinaire violet |
| Craterellus | cornucopioides | Trompette de la mort, des morts |
| Crepidotus | variabilis | Crépidote variable |
| Entoloma | rhodopolium | Entolome rose clair |
| Fistulina | hepatica | Langue de boeuf |
| Fomitopsis | pinicola | Polypore marginé |
| Gyroporus | castaneus | Bolet châtain |
| Hebeloma | sinapizans | Hébélome brulant |
| Helvella | lacunosa | Helvelle lacuneuse |
| Hydnellum | concrescens | Hydnelle à chapeaux accolés |
| Hydnum | repandum | Pied de mouton |
| Hydnum | rufescens | Pied de mouton orangé |
| Hygrophorus | eburneus | Hygrophore blanc ivoire |
| Hypholoma | fasciculare | Hypholome en touffes |
| Laccaria | amethystina | Laccaire améthyste |
| Laccaria | laccata | Clitocybe laqué |
| Lactarius | camphoratus | Lactaire à odeur de chicorée |
| Lactarius | deliciosus | Lactaire délicieux |

| | | |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Lactarius | serifluus | Lactaire petit-lait |
| Lactarius | uvidus | Lactaire humide |
| Leccinum | quercinum | Bolet orangé des chênes |
| Leccinum | variicolor | Bolet ramoneur |
| Leotia | lubrica | Léotie visqueuse |
| Lepiota | ignivolvata | Lépiote à base rouge |
| Clitocybe | nebularis | Clitocybe nébularis |
| Lycoperdon | perlatum | Vesse de loup perlée |
| Macrolepiota | procera | Coulemelle, Lépiote élevée |
| Marasmiellus | ramealis | Marasme des ramilles |
| Megacollybia | platyphylla | Collybie à lames larges |
| Mycena | alcalina | Mycène à chair mince |
| Mycena | galericulata | Mycène en casque |
| Mycena | pelianthina | Mycène gris-violet |
| Mycena | polygramma | Mycène à pied strié |
| Mycena | rosea | Mycène rose |
| Otidea | alutacea | Otidée couleur de cuir |
| Panellus | stipticus | Panelle styptique |
| Pleuroflammula | tuberculosa | Pholiote à pied arqué |
| Fomitopsis | betulina | Polypore du bouleau |
| Pluteus | cervinus | Plutée couleur de cerf |
| Pluteus | leoninus | Plutée jaune lion |
| Psathyrella | piluliformis | Hypholome hydrophile |
| Pseudocraterellus | sinuosus | Chanterelle sinueuse |
| Ramaria | stricta | Clavaire, Ramaire dressée, droite |
| Rozites | caperatus | Pholiote ridée |
| Russula | brunneoviolacea | Russule brun violacé |
| Russula | claroflava | Russule jaune clair |
| Russula | langei | Russule charbonnière à pied dur |
| Russula | densifolia | Russule à lames serrées |
| Russula | fragilis | Russule fragile |
| Russula | heterophylla | Russule à lames fourchues |
| Russula | ionochlora | Russule couleur de violette |
| Russula | mairei | Russule de Maire |
| Russula | nigricans | Russule noircissante |
| Russula | ochroleuca | Russule ocre et blanche |
| Russula | raoultii | Russule jaune pâle de Raoult |
| Russula | sanguinea | Russule sanguine, rouge sang |
| Russula | torulosa | Russule pied bleu |
| Russula | vinosobrunnea | Russule brun vineux |
| Russula | violeipes | Russule à pied violet |
| Scleroderma | areolatum | Scléroderme aréolé |
| Scleroderma | citrinum | Scléroderme commun |
| Stereum | hirsutum | Stérée hirsute |
| Suillus | bovinus | Bolet des bouviers |
| Trametes | versicolor | Tramète versicolore |
| Tremella | aurantia | Trémelle orangée |
| Tricholoma | album | Tricholome blanc |
| Tricholoma | saponaceum | Tricholome à odeur de savon |
| Tricholoma | sejunctum | Tricholome jaunet |
| Tricholoma | sulphureum | Tricholome soufré |
| Tricholoma | ustale | Tricholome brûlé |
| Tylopilus | felleus | Bolet amer, Bolet chicotin |
| Imleria | badia | Bolet bai |
| Hymenopellis | radicata | Collybie radicante |

Nom ancien ou synonyme

Boletus calopus
Clitocybe gibba
Collybia dryophila
Collybia fusipes
Collybia maculata
Pholiota tuberculosa

Nom actuel

Caloboletus calopus
Infundibulicybe gibba
Gymnopus dryophilus
Gymnopus fusipes
Rhodocollybia maculata
Pleuroflammula tuberculosa

Piptoporus betulinus
Xerocomus badius
Xerula radicata
Roland.

Fomitopsis betulina
Imleria badia
Hymenopellis radicata